

САРКЕНТ МАМЛЕКЕТТИК ЖАРАТЫЛЫШ ПАРКЫНЫН АВИФАУНАСЫ

А.С. Кулбаев¹, Б.М. Дженбаев², К.Ы. Стамалиев³, А.М. Абдыкааров³

¹Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек университети, Ош, Кыргызстан

²Улуттук илимдер академиясынын Биология институту, Бишкек, Кыргызстан

³Ош мамлекеттик университети, Ош, Кыргызстан

АВИФАУНА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА САРКЕНТ

А.С. Кулбаев¹, Б.М. Дженбаев², К.Ы. Стамалиев³, А.М. Абдыкааров³

¹Кыргызско-Узбекский университет им. Б.Сыдыкова, Ош, Кыргызстан

²Институт биологии Национальной академии наук, Бишкек, Кыргызстан

³Ошский государственный университет, Ош, Кыргызстан, к.б.н., доцент,

AVIFAUNA OF THE STATE NATURAL PARK SARKENT

A.Z. Kulbaev¹, B.M. Djenbaev², K.Y. Stamaliev³, A.M. Abdykaarov³

¹Kyrgyz-Uzbek International University named after Batyraly Sydykov, Osh, Kyrgyzstan

²Institute of Biology, National Academy of Sciences, Bishkek, Kyrgyzstan,

³Osh State University, Osh, Kyrgyzstan

abdusattarkulbaev@gmail.ru; bekmamat2002@mail.ru; kutman_s@mail.ru; aabdykaarov@mail.ru

Аннотация: Орнитологиялык изилдөөлөр 2018-2022-жылдары жүргүзүлдү. Саркент мамлекеттик жаратылыш паркынын аймагында кездешүүчү канаттуулар (Aves) классына таандык болгон 73 түр катталды. Алар 10 түркүм, 26 тукумга, 38 уруга таандык экендиги такталды, ал эми доминант уруулар кыш куйруктар (Phoenicurus), таркылдактар (Turdus) жана таранчылар (Passer) экендиги аныкталды. Канаттуулардын мезгили боюнча активдүү миграциясын эске алуу менен паркта жылдын бардык мезгилдеринде илимий экспедицияларды уюштуруу, ошондой эле жаратылыш паркынын аймагын комплекстүү изилдөө зарыл. Жергиликтүү калктын жана эс алуучулардын парктын флора жана фаунасына антропогендик таасирин азайтуу максатында парктын буфердик зоналарын кеңейтүү жана ага мамлекеттик корук статусун берүү зарылдыгын белгилейбиз.

Негизги сөздөр: түр, класс, фауна, экосистема, индикатор, орнитология, миграция, ландшафт, доминант, особ, антропоген, жаратылыш паркы.

Аннотация. Орнитологические исследования проводились в период 2018-2022 годах. Зарегистрировано 73 вида, встречающихся на территории Саркентского государственного природного парка, относящиеся к классу птиц. Установлено, что из встречающихся представителей видов класса птиц относятся к 10 отрядам, 26 семействам, 38 родам, а также по видовому составу доминантными родами являются горихвостки (Phoenicurus), дрозды (Turdus) и воробьи (Passer). Учитывая активную миграцию птиц по сезонам, необходимо организовывать научные экспедиции на территории парка во все сезоны года, а также комплексные исследования территории природного парка. В целях снижения антропогенного воздействия местного населения и отдыхающих на флоре и фауне парка, отмечаем необходимость расширения охранных зон парка и придания ему статуса государственного заповедника.

Ключевые слова: вид, класс, фауна, экосистема, индикатор, орнитология, миграция, ландшафт, доминант, особ, антропоген, природный парк.

Annotation: Ornithological research was carried out in the period 2018-2022. Registered 73 species found on the territory of the Sarkent State Natural Park, belonging to the class of birds. It

has been established that among the representatives of species of the class of birds found, they belong to 10 orders, 26 families, 38 genera, and the dominant genera in terms of species composition are redstarts (*Phoenicurus*), thrushes (*Turdus*) and sparrows (*Passer*). Considering. Given the active migration of birds by season, it is necessary to organize scientific expeditions in the park in all seasons of the year, as well as a comprehensive study of the territory of the natural park. In order to reduce the anthropogenic impact of the local population and vacationers on the flora and fauna of the park, we note the need to expand the protected zones of the park and give it the status of a state reserve.

Key words: species, class, fauna, ecosystem, indicator, ornithology, migration, landscape, dominant, special, anthropogenic, natural park.

Актуальность темы. Для разработки методов и принципов рационального использования и реконструкции, охраны живых ресурсов природы необходимо иметь локальные четкие сведения об их относительной доле в мировой фауне и флоре, об их состоянии в отдельных регионах и по всей республике. Поэтому, прежде всего, для общенаучной оценки фауны и флоры страны возникает необходимость провести инвентаризацию фауны и флоры отдельных районов, составляющих определенную ее часть [1, 7].

Одним из его живых компонентов и частью природного богатства Кыргызстана являются птицы. В отличие от других животных, птицы населяют все участки земной поверхности.

Птицы, как важнейший компонент позвоночных животных на Земле, имеют большое значение в природе и в хозяйстве человека. Например, птицы регулируют численность вредителей зеленых растений, выполняют важнейшую функцию санитаров и хищников, и их заслуга в поддержании экологического баланса огромна. Они также служат ключевым показателем при определении экологического состояния окружающей среды [7, 8].

Цель исследования. Определить видовой состав орнитофауны природного парка «Саркент» и установить современное состояние, а также меры по их охране.

Место и методы исследования. Государственный природный парк «Саркент» создан в соответствии с постановлением № 415 Правительства Кыргызской Республики от 27 июня 2009 года. Государственный природный парк Саркент расположен на территории Ляйлякского района Баткенской области, в 141 километре к юго-западу от областного центра города Баткен, географические координаты которого являются координаты 42°15' северной широты, 71°12' восточной долготы северного полушария. «Саркент» - это древнее название населенного пункта, в котором с незапамятных времен жили кыргызы. Почти 67% территория парка граничит с Ганчинским районом Таджикской Республики.

Целью организации природного парка является охрана естественного состояния всего природного комплекса Туркестанского хребта, гидрологического режима геологических образований флоры и фауны, а также быстро сокращающихся по численности редких видов животных и растений.

Общая площадь Саркентского государственного природного парка составляет 40 000 га, из них 14 257 га (35,6 %) - заповедная территория, 24 660,9 га (31,7 %) - продуктивная территория, 1 082,1 га (2,7 %) - рекреационная зона. Общая территория парка состоит из скалистых и ледниковых нагорий, многослойных, дно которых похоже на узкие горные ворота, вершина которых образована широкими оползнями, и возвышается на 1 400-5 200 метров над уровнем моря.

Сбор материала проводился в весенне-летнее время года на различных ландшафтах природного парка «Саркент» в ходе экспедиции, организованной с 2018 по 2022 гг. Количественные данные получены путем регулярного, но не очень точно установленного маршрутного учета, организованного по методике Ю.Равкина [4]. А идентификацию видов проводили по общеизвестным определителям и монографиям [1, 6].

Маршрутами экспедиции по реке Ак-Суу являются перевалы и ущелья Жаны-Конуш, Агелек, Асман-Жайлоо, Кашка-Суу, Кол, Жалгыз-Чайыр. Общая протяженность маршрута составила (весной 37 км, летом 54 км) 91 километр.

Орнитофаунистические исследования проводились с помощью общепринятых зоологических и экологических комплексных методов исследования. Таксономическая группировка птиц проводилась с учетом различных изменений характеристик среды их обитания [2, 6, 8].

Количественные показатели исследуемых материалов подвергали статистической обработке на основе общепринятых формул биологической статистики [3, 5].

Установлено 73 вида птиц, относящиеся к 10 отрядам. Из них: из отряда соколиных (Falconiformes) - 11; отряда куриных (Galliformes) - 3; отряда ржанковых (Charadriiformes) - 2; отряда голубиных (Columbiformes) - 3; отряда кукушкообразных (Cuculiformes) - 1; отряда совообразных (Strigiformes) - 2; отряда козодоеобразных (Caprimulgiformes) - 1; отряда ракшеобразных (Coraciiformes) - 1; отряда удообразных (Upipiformes) - 1; отряда воробьинообразных (Passeriformes) - 48 видов (таблица).

Таблица. Систематический список и категории зарегистрированных птиц (Aves) в государственном природном парке Саркент

№	Русские названия видов	Латинское название видов	Кыргызское название видов	№ каталога и характер пребывания	CITES KR, RL	*	0
						**	1
						***	2
						****	3
							4
							?
I.	ОТРЯД : СОКОЛООБРАЗНЫЕ - FALCONIFORMES Sharpe, 1874						
I.	Семейство: Скопиные - Pandionidae Bonaparte, 1854						
I.	Род: Ястребы – Accipiter Brisson, 1760						
	Виды:						
1.	Ястреб-перепелятник	<i>Accipiter nisus</i> Linnaeus, 1758	Кыргыз	BW, 131	II	***	
II.	Род: Сарычи – Buteo Lacpede, 1799						
2.	Зимняк, или мохноногий канюк	<i>Buteo lagopus</i> (Pontoppidan, 1763)	Жут сары (ак сары)	W, 135	II	**	
3.	Курганник	<i>Buteo rufinus rufinus</i> (Cretzschmar, 1827)	Жаман сары (кызыл сары)	BW, 137	II	***	
III.	Род: Орлы – Aquila Brisson, 1760						
4.	Беркут	<i>Aquila chrysaetos daphanea</i> Linnaeus, 1758	Бүркүт	BW, 147	II, KR	**	2
IV.	Род: Черные грифы – Aegypius Savigny, 1809						
5.	Гриф черный	<i>Aegypius monachus</i> (Linnaeus, 1766)	Таз кара	BW, 150	II, RL KR	**	1
V.	Род: Сипы – Gyps Savigny, 1809						
6.	Сип белоголовый	<i>Gyps fulvus fulvus</i> (Hablizl, 1783)	Ак кажыр	BW, 151	II, KR	*	2
7.	Гриф снежный	<i>Gyps himalayensis</i> Hume, 1869)	Кумай	BW, 152	II, KR	**	2
VI.	Род: Стервятники – Neophron Savigny, 1809						
8.	Стервятник	<i>Neophron percnopterus</i> Linnaeus, 1758	Журтчу, тарпчы	BW, 148	II, KR	**	
VII.	Род: Бородачи – Gypaetus Storr, 1784						
9.	Бородач	<i>Gypaetus barbatus</i> Linnaeus, 1758	Көк жору, балта жутар	BW, 149	II, KR	**	
II.	Семейство: Соколиные – Falconidae Vigors, 1824						
I.	Род: Сокола – Falco Linnaeus, 1758						
10.	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Жагалмай	B, 166	II,	***	
11.	Пустельга обыкновенная	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Күйкө (кадимки күйкө)	BW, 162	II,	****	
II.	ОТРЯД: КУРООБРАЗНЫЕ – GALLIFORMES Temminck, 1820						
I.	Семейство: Тетеревидные – Tetraonidae Leach, 1820						
I.	Род: Улары – Tetraogallus J.E.Gray, 1832						
12.	Улар гималайский	<i>Tetraogallus himalayensis</i> G.R.Gray, 1843	Улар	BW, 172	-	**	

II.	Род: Кеклики – <i>Alectoris</i> Kaup, 1829						
13.	Кеклик (каменная куропатка)	<i>Alectoris chukar falki</i> (J.E.Gray, 1830)	Кекилик	BW, 177	-	****	
II.	Род: Фазаны – <i>Phasianus</i> Linnaeus, 1758						
14.	Фазан	<i>Phasianus colchicus turkestanicus</i> Linnaeus, 1758	Кыргоол	BW, 184	-	***	
III.	ОТРЯД: РЖАНКООБРАЗНЫЕ – <i>CHARADRIIFORMES</i> Huxley, 1867						
I.	Семейство: Ржанковые – <i>Charadriidae</i> Leach, 1820						
I.	Род: Серпоклюв – <i>Ibidorhyncha</i> Vigors, 1832						
15.	Серпоклюв	<i>Ibidorhyncha struthersii</i> Vigors, 1832	Орок тумшук чулдук (көк чулдук)	BW, 239	KR	*	
II.	Семейство: Бекасовые – <i>Scolopacidae</i> Rafinesque, 1815						
II.	Род: Перевозчики – <i>Actitis</i> Illiger, 1811						
16.	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Ташырман чулдук	B, 250	-	***	
IV.	ОТРЯД: ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ – <i>COLUMBIFORMES</i> (Latham, 1790)						
I.	Семейство: Голубиные – <i>Columbidae</i> Leach, 1820						
I.	Род: Голуби – <i>Columba</i> Linnaeus, 1758						
17.	Вяхирь, или витютень	<i>Columba palumbus casiotis</i> Linnaeus, 1758	Алагуу	BM, 356	-	**	
18.	Голубь сизый	<i>Columba livia neglecta</i> Gmelin, 1789	Көгүчкөн	BW, 351	-	***	
II.	Род: Горлицы – <i>Streptopelia</i> Bonaparte, 1855						
19.	Горлица большая	<i>Streptopelia orientalis meena</i> (Latham, 1790)	Чоң бактек (чыгыш бактеги)	B, 359	-	***	
V.	ОТРЯД: КУКУШКООБРАЗНЫЕ – <i>CUCULIFORMES</i> (Wagler, 1830)						
I.	Семейство: Кукушковые – <i>Cuculidae</i> Leach, 1820						
I.	Род: Кукушки – <i>Cuculus</i> Linnaeus, 1758						
20.	Кукушка (обыкновенная кукушка)	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Күкүк, зейнеп	B, 371	-	***	
VI.	ОТРЯД: СОВООБРАЗНЫЕ – <i>STRIGIFORMES</i> Wagler, 1830						
I.	Семейство: Совиные – <i>Strigidae</i> Leach, 1820						
I.	Род: Филины – <i>Bubo</i> Dumeril, 1806						
21.	Филин (филин обыкновенный)	<i>Bubo bubo hemachalanus</i> Linnaeus, 1758	Үкү (чоң үкү, сары үкү)	BW, 380	II KR	**	
II.	Род: Домовые сычи – <i>Athene</i> Boie, 1822						
22.	Сыч домовый	<i>Athene noctua bactriana</i> (Scopoli, 1769)	Бабырган, байкуш	BW, 386	II	***	
VII.	ОТРЯД: КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ – <i>CAPRIMULGIFORMES</i> Ridgway, 1881						
I.	Семейство: Козодои – <i>Caprimulgidae</i> Vigors, 1825						
I.	Род :Козодои – <i>Caprimulgus</i> Linnaeus, 1758						
23.	Козодои обыкновенный	<i>Caprimulgus europaeus unwini</i> Linnaeus, 1758	Теликуш (телкикуш, чегирткечи)	B, 394	-	***	
VIII.	ОТРЯД: РАКШЕОБРАЗНЫЕ – <i>CORACIIFORMES</i> Forbes, 1884						
I.	Семейство: Щурковые – <i>Meropidae</i> Rafinesque, 1815						
I.	Род: Щурки – <i>Merops</i> Linnaeus, 1758						
24.	Щурка золотистая	<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	Көк соору	B, 407	-	***	
IX.	ОТРЯД: УДОДООБРАЗНЫЕ – <i>UPUPIFORMES</i>						
I.	Семейство: Удодовые – <i>Upupidae</i> Leach, 1820						
I.	Род: Удоды – <i>Upupidae</i> Linnaeus, 1758						
25.	Удод	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Үпүп	B, 411	-	***	
X.	ОТРЯД: ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ – <i>PASSERIFORMES</i> Linnaeus, 1758						
I.	Под отряд: ВОРОБЬИ – <i>PASSERES</i>						
I.	Семейство: Ласточковые – <i>Hirundinidae</i> Rafinesque, 1815						
I.	Род: Береговые ласточки – <i>Riparia</i> T.Forster, 1817						

26.	Ласточка береговая	<i>Riparia riparia</i> Linnaeus, 1758	Жар чабалекей	B, 443	-	**	
II.	Род: Скалистые ласточки – <i>Ptyonoprogne</i> Reichenbach, 1850						
27.	Ласточка скальная	<i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769)	Тоо чабалекейи	B, 444	-	**	
III.	Род: Городская ласточка – <i>Delichon</i> Horstfield et Moore, 1854						
28.	Воронок, ласточка лордская,	<i>Delichon urbica urbica</i> (Linnaeus, 1758)	Шаар чабалекейи (ак куйрук чабалекей)	B, 449	-	***	
IV.	Семейство: Трясогузковые – <i>Motacillidae</i> Horsfield, 1821						
I.	Подсемейство: Коньки – <i>Anthinae</i>						
I.	Род: Коньки – <i>Anthus</i> Bechstein, 1805						
29.	Конек лесной	<i>Anthus trivialis trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Токой эрсынаары	B, 460	-	***	
II.	Подсемейство: Трясогузки – <i>Motacillinae</i>						
II.	Род: Трясогузки – <i>Motacilla</i> Linnaeus, 1758						
I.	Подрод: Трясогузки – <i>Motacilla</i> Linnaeus, 1758						
30.	Трясогузка горная	<i>Motacilla cinerea cinerea</i> Tunstall, 1771	Тоо жылкычы чымчыгы	B, 454	-	***	
31.	Трясогузка маскирован-ная	<i>Motacilla personata</i> Gould, 1885	Жылкычы кучкач	B,	-	***	
II.	Семейство: Сорокопудовые – <i>Laniidae</i> Rafinesque, 1815						
I.	Подсемейство: Сорокопудовые – <i>Laniinae</i> Rafinesque, 1815						
I.	Род: Сорокопуды – <i>Lanius</i> Linnaeus, 1758						
32.	Жулан туркестанский	<i>Lanius isabellinus phoenicuroides</i> (Schalow, 1875)	Кашгар борбашы	B,	-	***	
III.	Семейство: Скворцовые – <i>Sturnidae</i> Rafinesque, 1815						
I.	Подсемейство: Скворцы – <i>Sturninae</i>						
I.	Род: Скворцы – <i>Sturnus</i> Linnaeus, 1758						
I.	Подрод: Розовые скворцы – <i>Pastor</i> Temminck, 1815						
33.	Скворец розовый	<i>Sturnus roseus</i> (Linnaeus, 1758)	Ала чыйырчык	B, 741	-	****	
II.	Род: Майны – <i>Acridotheres</i> Vieillot, 1816						
34.	Майна, или индийский скворец	<i>Acridotheres tristis tristis</i> (Linnaeus, 1766)	Майна (ала канат, индия чыйырчыгы)	BW, 744	-	****	
IV.	Семейство: Вороновые – <i>Corvidae</i> Leach, 1820						
I.	Род: Сороки: – <i>Pica</i> Brisson, 1760						
35.	Сорока	<i>Pica pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Сагызган	BW, 752	-	****	
II.	Род: Клушицы – <i>Pyrhacorax</i> Tunstall, 1771						
36.	Клушица	<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i> (Linnaeus, 1758)	Кызыл тушмук чөкө таан	BW, 756	-	***	
37.	Галка альпийская	<i>Pyrhacorax graculus</i> (Linnaeus, 1766)	Сары тумшук чөкө таан	BW, 757	-	**	
III.	Род: Вороны – <i>Corvus</i> Linnaeus, 1758						
I.	Подрод: Вороны – <i>Corvus</i> Linnaeus, 1758						
38.	Ворон	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Кузгун	BW, 765	-	**	
V.	Семейство: Оляпки – <i>Cinclidae</i> Sundevall, 1836						
I.	Род: Оляпки – <i>Cinclus</i> Borkhausen, 1797						
39.	Оляпка бурая	<i>Cinclus pallasii pallasii</i> Temminck, 1820	Суучул кара (Палластын суучул карасы)	BW, 484	-	**	
VI.	Семейство: Крапивниковые – <i>Troglodytidae</i> Swainson, 1831						
I.	Род: Крапивники – <i>Troglodytes</i> Vieillot, 1807						
40.	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Короолу	BW, 485	-	***	
VII.	Семейство: Завирушковые – <i>Prunellidae</i> Richmond, 1908						
I.	Род: Лесные завирушки – <i>Prunella</i> Vieillot, 1816						

I.	Подрод: Бледные завирушки - <i>Prunella</i> Vieillot, 1816						
41.	Завирушка бледная	<i>Prunella fulvescens</i> (Severtzov, 1872)	Көк шалкы (боз созолоң, куба көк шалкы)	BW, 489	-	**	
42.	Завирушка черногорлая	<i>Prunella atrogularis atrogularis</i> (Brandt, 1844)	Кара тамак карагай сайрак	BW, 491	-	***	
43.	<u>Подвид</u>	<i>Prunella atrogularis huttoni</i> (Horsfield et Moore, 1854)		W,			
VIII.	Семейство: Славковые – <i>Sylviidae</i> Leach, 1820						
44.	Камышевка индийская	<i>Acrocephalus agricola</i> (Jerdon, 1845)	Индостан камышчы	B, 570	-	***	
45.	Камышевка садовая	<i>Acrocephalus dumetorum</i> Blyth, 1849	Бакчыл камышчы	B, 571	-	**	
I.	Род : Славки -<i>Sylvia</i> Scopoli, 1769						
46.	Славка серая	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Боз шалкы	B, 585	-	***	
II.	Род : Пеночки-<i>Phylloscopus</i> Boie, 1826						
I.	Подрод : Пеночки – <i>Phylloscopus</i> Boie, 1826						
47.	Весничка (пеночка-весничка)	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Ала аяк мыймыт (жаз сарыкаш)	M, 590	-	**	
48.	Теньковка (пеночка-теньковка)	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)	Кара аяк мыймыт	M, 591	-	***	
II.	Подрод : Зеленые пеночки-<i>Acanthopneuste</i> Blasius, 1858						
49.	Пеночка зеленая	<i>Phylloscopus trochiloides</i> (Sundevall, 1837)	Жашыл мыймыт (жашыл сарыкаш)	B, 601	-	***	
III.	Подрод : Пеночки зарнички-<i>Reguloides</i> Blyth, 1847						
50.	Пеночка-зарничка	<i>Phylloscopus inornatus</i> (Blyth, 1842)	Кидик мыймыт (таң сарыкашы)	M, 598	-	**	
IX.	Семейство : Мухоловковые-<i>Muscicapidae</i> Fleming, 1822						
I.	Подсемейство : Мухоловки-<i>Muscicapinae</i>						
I.	Род: Серые мухоловки-<i>Muscicapa</i> Brisson, 1760						
51.	Мухоловка серая	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Чымынчы	B, 611	-	**	
II.	Род : Длиннохвостые мухоловки-<i>Terpsiphone</i> Gloger, 1827						
52.	Мухоловка райская	<i>Terpsiphone paradise</i> Linnaeus, 1758	Узун куйрук чымынчы	B, 611	KR	*	
X.	Семейство : Дроздовые-<i>Turdidae</i> Rafinesque, 1815						
I.	Подсемейство : Дрозды-<i>Turdinae</i>						
I.	Род : Чеканы-<i>Saxicola</i> Bechstein, 1803						
53.	Чекан черноголовый	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	Котурепей (карабаш чакчак)	B, 515	-	***	
II.	Род : Каменки-<i>Oenanthe</i> Vieillot, 1816						
54.	Каменка-пласунья	<i>Oenanthe isabellina</i> (Temminck, 1829)	Чакчыгай	B, 517	-	****	
III.	Род : Горихвостки-<i>Phoenicurus</i> T.Forster, 1817						
55.	Горихвостка седоголовая	<i>Phoenicurus caeruleocephalus</i> Vigors, 1831	Карала кыш куйрук	B, 506	-	***	
56.	Горихвостка обыкновенная	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Кызыл куйрук (кадимки кыш куйрук)	M, 508	-	*	
57.	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S.G.Gmelin, 1774)	Кара кызыл куйрук	B, 507	-	***	
IV.	Род : Дрозды-<i>Turdus</i> Linnaeus, 1758						
58.	Дрозд чернозобый	<i>Turdus atrogularis</i> Jarocki, 1819	Кара тамак таркылдак (кара төш)	W,	-	***	
59.	Дрозд черный	<i>Turdus merula merula</i> Linnaeus, 1758	Кара таркылдак	BW, 538	-	****	

60.	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i> <i>viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Чаар таркылдак	BW, 548	-	***	
V.	Род : Синие птицы- <i>Myophonus</i> Temminck, 1822						
61.	Синяя птица	<i>Myophonus caeruleus</i> (Scopoli, 1786)	Сай сагызган	B, 531	-	**	
VI.	Семейство: Синицевые-<i>Paridae</i> Vigors, 1825						
I.	Подсемейство : Синицы-<i>Parinae</i>						
I.	Род: Синицы-<i>Parus</i> Linnaeus, 1758						
I.	Подрод : Рыжешейные синицы-<i>Periparus</i> Selys-Longchamps, 1884						
62.	Синица рыжешейная	<i>Parus rufonuchalis</i> Blyth, 1849	Кызыл моюн кашка чымчык	BW, 631	-	***	
II.	Подрод : Лазоревки: <i>Cyanistes</i> Каур, 1829						
63.	Князёк	<i>Parus cyaneus</i> Pallas, 1770	Ак кашка чымчык	BW, 637	-	***	
64.	Князек желтогрудый	<i>Parus flavipectus</i> Severtzov, 1873	Сары төш кашка чымчык	BW, 638	-	***	
VII.	Семейство : Поползни-<i>Sittidae</i> Lesson, 1822						
I.	Род :Стенолазы-<i>Tichodroma</i> Illiger, 1811						
65.	Стенолаз, краснокрылый стенолаз	<i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1766)	Тоголок кызыл канат	BW, 645	-	*	
VIII.	Семейство :Воробьиные (Ткачиковые) –<i>Passeridae (Ploseidae)</i> Rafinesque, 1815						
I.	Род : Воробьи-<i>Passer</i> Brisson, 1760						
66.	Воробей домовый	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Таранчы (сарай таранчысы)	BW, 726	-	****	
67.	Воробей черногрудый, испанский воробей	<i>Passer hispaniolensis</i> (Temminck, 1220)	Испан таранчысы	B, 728	-	****	
68.	Воробей полевой	<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	Чымчык (талаа таранчысы)	BW, 731	-	****	
IX.	Семейство : Вьюрковые-<i>Fringillidae</i> Leach, 1758						
I.	Род: Щеглы – <i>Carduelis</i> Brisson, 1760						
69.	Щегол седоголовый	<i>Carduelis caniceps</i> Vigors, 1831	Сава чымчык, (сары канат, ак баш кооз мукур)	BW,	-	***	
II.	Род: Чечевицы-<i>Carpodacus</i> Каур, 1829						
70.	Чечевица обыкновенная	<i>Carpodacus erythrinus</i> (Pallas, 1770)	Эжеке бээ саа (кадимки эжеке бээ саа)	B, 709	-	***	
71.	Чечевица арчовая	<i>Carpodacus rhodochlamys</i> (Brandt, 1843)	Арча чымчыгы	BW, 711	-	**	
III.	Род: Арчевые дубоносы-<i>Mycerobas</i> Cabanis, 1847						
72.	Дубонос арчовый	<i>Mycerobas carnipes</i> (Hodgson, 1836)	Арчагы балта тумшук	BW, 724	-	***	
X.	Семейство : Овсянковые-<i>Emberizidae</i> Vigors, 1825						
I.	Род : Овсянковые – <i>Emberiza</i> Linnaeus, 1758						
I.	Подрод : Овсянки – <i>Emberiza</i> Linnaeus, 1758						
73.	Овсянка Стюарта	<i>Emberiza stewarti</i> (Blyth, 1854)	Стюарт думбулу	B, 658	-	**	

Условные знаки: «В» - гнездящиеся; «W» - зимующие; «М» - мигранты; «BW» - оседлые.

Количество особей: «*» – слишком мало; «**» – мало; «***» – много; «****» – слишком много.

В ходе зоолого-экологических (орнитологических) исследований на территории Саркентского государственного природного парка выявлено 73 вида из 390 видов птиц, обитающих на территории Кыргызстана, т.е. было выявлено только 18,7% птиц.

Закключение. 1. Установлено, что из встречающихся представителей видов класса птиц относятся к 10 отрядам, 26 семейству, 38 родам, а также по видовому составу доминантными родами являются горихвостки (*Phoenicurus*), дрозды (*Turdus*) и воробьи (*Passer*).

2. Учитывая активную миграцию птиц по сезонам, необходимо организовывать научные экспедиции на территории парка во все сезоны года, а также комплексные исследования на территории природного парка.

3. В целях снижения антропогенного воздействия местного населения и отдыхающих на флору и фауну парка, отмечаем необходимость расширения охранных зон парка и придания ему статуса государственного заповедника.

ЛИТЕРАТУРА

1. Второв, П.П. Определитель птиц фауны СССР [Текст]: Пособие для учителей / П.П.Второв, Н.Н.Дроздов. – М.: Просвещение, 1980. – 256 с. ил.
2. Кулбаев, А.З. Трясогусковые птицы обитатели государственного национального природного парка Кара-Шоро. [Текст]:/Кулбаев А.З. Стамалиев К.Ы. Абдыкааров А.М// -Ош. НОТ 2023 г-С .23-28.
3. Лакин, Г.Ф. Биометрия [Текст] / Г.Ф. Лакин.- М.: Высш. шк., 1990. – 352 с.
4. Равкин, Ю.С К методике учета птиц лесных ландшафтов во внегнездовое время [Текст]: // Организация и методы учета птиц и вредных грызунов / Ю.С. Равкин, Б.П. Доброхотов. – М.: 1963. – С. 130-136.
5. Рокицкий, П.Ф. Биологическая статистика [Текст] / П.Ф. Рокицкий. – Минск, Вышэйш. шк., 1967. – 328 с.
6. Систематический список позвоночных животных Кыргызстана [Текст] / [Т. Хардер, В.И. Торопова, С.В. Кулагин и др.] – Бишкек: Б.и., 2010. – 116 с.
7. Стамалиев К.Ы. Современное состояние авифауны Сары-Челекского биосферного заповедника [Текст]: / К.Ы.Стамалиев // Сб. тез. докл. Межд. конф. – Душанбе, 2011в. – С. 110-111.
8. Шукуров Э.Дж. Птицы Киргизии: науч. попул. очерк [Текст]: / Э.Д.Шукуров. – Фрунзе, Мектеп, 1981. Ч. 1. – 144 с.

УДК.582.734 (735.3)

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЗАПАДНОГО ПАМИРА

А. А. Маматризохонов

Хорогский государственный университет им.М.Назаршоева, г. Хорог, Таджикистан

БАТЫШ ПАМИРДИН ӨСҮМДҮКТӨРҮНҮН НЕГИЗГИ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

А.А.Маматризохонов

М.Назаршоев атындагы Хорог мамлекеттик университети, Хорог, Тажикстан

MAIN FEATURES OF THE VEGETATION OF THE WESTERN PAMIRS

A. A. Mamadrizohonov

Khorog State University named after M. Nazarshoev, Khorog, Tajikistan

Akbar Mamadrizokhonov <akbar63@mail.ru>

В результате анализов выявлено, что на территории Западного Памира произрастают немало дикорастущих видов растений, среди которых значительное число эндемичных видов, определяющих своеобразие флоры региона. Показано, что в разных частях региона проявляется разнообразная по характеру растительность, типы которой связаны с разными условиями среды оби-